

Tabell 1. Rødliste arter registrert i kjerneområdet (se kart i vedlegg 4) til Jernåa naturreservat (Klepsland 2008, Lorentzen m.fl. 2018 & Artskart <https://artskart.artsdatabanken.no/>). Artslista registrert av Klepsland er her gjennomgått etter ny rødliste av 2015. Artenes status i listen nedenfor er derfor ikke sammenfallende med status i 2008.

Gruppe	Art	Status ¹	Voksested ²
Grasfamilien	Huldregras <i>Cinna latifolia</i>	NT	«Arten vokser i fuktig, skyggefull barskog og blandingsskog, ofte på mosematter på berg eller store stein i bekkekløfter».
Busk- og bladlav	Gubbeskjegg <i>Alectoria sarmentosa</i>	NT	Arten vokser hovedsakelig på gamle grantrær.
	Sprikeskjegg <i>Bryoria nadvornikiana</i>	NT	Arten vokser hovedsakelig på eldre, fuktig, gran- eller bjørkedominert skog
	Flatsaltlav <i>Stereocaulon coniophyllum</i>	VU	Arten vokser på steiner og berg i tett tilknytning til hurtig rennende vann.
	Grynkolve <i>Pilophorus cereolus</i>	VU	Arten vokser i områder med jevn tilgang på vann (sprut/vanndamp/sildrevann) inntil bekker og elver, langs fuktige bergvegger og i fjellet.
	Huldrestry <i>Usnea longissima</i>	EN	Arten vokser hovedsakelig på gran i gammel, fuktig, skyggefull og glissen granskog.
Skorpelav	Rimnål <i>Chaenothecopsis viridialba</i>	NT	«Arten vokser i eldre, naturskogspreget gransumpskog, på døde kvister og på stammer av gamle grantrær».
	Rustdoggnål <i>Sclerophora coniophaea</i>	NT	«Arten vokser i rike og fuktige skogtyper, granskoger, bjørkeskoger og edelløvskoger på gamle trær, eller høgstubber».
	Rotnål <i>Microcalicium ahlneri</i>	NT	«Arten vokser i eldre gran- eller furudominert skog på død ved med brunrâte i forholdsvis sein nedbrytningsfase».
	Sukkernål <i>Chaenotheca subroscida</i>	NT	Arten vokser på eldre grantrær.
	Smalhodenål <i>Chaenotheca hispidula</i>	VU	«Arten vokser i rike, naturskogspregete gran- og løvskoger på høgstubber og gamle, levende løvtrær og grov einer».
Sopp vedboende	Rynkeskinn <i>Phlebia centrifuga</i>	NT	Arten vokser i gammel granskog, på læger av gran, hvor det er noe fuktige miljø.
	Svartsonekjuke <i>Phellinus nigrolimitatus</i>	NT	Arten vokser hovedsakelig på læger av gran, men kan også (vesentlig sjeldnere) finnes på furulæger.
	Rosenkjuke <i>Fomitopsis rosea</i>	NT	Arten vokser i gammel gran- og blandingsskog på barkløse granlæger.
	Honninghvitkjuke <i>Antrodia mellita</i>	VU	Arten er i hovedsak tilknyttet grove ospelæger.
	Klengekjuke <i>Skeletocutis brevispora</i>	VU	Arten vokser i gammel granskog, på læger av gran.

¹Rødlistestatus pr. 2018 (Artsdatabanken 2018).

²Informasjonen er hentet fra nettversjonen av rødlista 2015 (Artsdatabanken 2018).